

## 7. Fixpont tételek


Az

$$x = f(x) \quad (7.1)$$


egyenletet *fixpont egyenletnek* nevezzük, annak egy  $p$  megoldását pedig az  $f$  függvény *fixpontjának* hívjuk. A fixpont egyenlettel az általános esetben, azaz amikor az  $f$  függvény metrikus vagy normált terek között értelmezett leképezés, a 7.2. szakaszban foglalkozunk. Általános feltételeket fogunk megadni, amelyek garantálják a fixpont létezését és egyértelműségét, sőt numerikus módszert is kapunk a fixpont közelítésére. A 7.3. szakaszban példákon illusztráljuk, hogy számos matematikai feladat megoldása létezését és egyértelműségét igazolhatjuk úgy, hogy a feladatot átfogalmazzuk fixpont egyenletté, és arra alkalmazunk egy fixpont létezésére vonatkozó általános tételt, ú.n. *fixpont tételt*. Számos fixpont tételt fogalmaztak meg a matematika különböző területein. Mi a 7.2. szakaszban az egyik legfontosabb esettel, a Banach-féle fixpont tétellel foglalkozunk részletesen, de a 7.4. szakaszban felsorolunk – a teljesség igénye nélkül – néhány egyéb gyakran használt fixpont tételt is.

### 7.1. Fixpont feladat valós függvényekre

Ebben a szakaszban a (7.1) fixpont egyenlet legegyszerűbb esetével foglalkozunk, amikor  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  valós függvény. Ebben az esetben geometriai jelentést tudunk hozzárendelni a fixpontokhoz: az  $f$  függvény fixpontjai a függvény grafikonja és az identikus függvény grafikonja metszéspontjainak  $x$ - illetve  $y$ -koordinátái lesznek. (Lásd a 7.1. ábrát, ahol  $p$ ,  $q$  és  $r$  fixpontjai  $f$ -nek.) A geometriai háttér miatt rögtön kapjuk a következő állítást a fixpont létezésére vonatkozóan.



7.1. ábra.



7.2. ábra.

**7.1. Tétel.** Legyen  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  folytonos függvény. Ekkor  $f$ -nek létezik fixpontja  $[a, b]$ -ben. Ha továbbá  $f$  differenciálható  $(a, b)$ -n, és létezik olyan  $0 \leq c < 1$  konstans, hogy  $|f'(x)| \leq c$  minden  $x \in (0, 1)$ -re, akkor  $f$ -nek pontosan egy fixpontja létezik  $[a, b]$ -ben.

**Bizonyítás:** A fixpont létezése, azaz az a tény, hogy az  $f$  függvény grafikonja metszi az  $y = x$  egyenest, triviálisan adódik a feltételekből (lásd a 7.2. ábrát).

Tegyük fel, hogy van két különböző fixpontja  $f$ -nek,  $p$  és  $q$  (lásd a 7.3. ábrát). Ekkor a Lagrange-féle középérték-tétel szerint van olyan  $\xi$  pont  $p$  és  $q$  között, ahol  $f'(\xi) = 1$ , ami ellentmond a feltételeknek.  $\square$

Egy megadott  $x_0$  kezdeti értékből indított, és az

$$x_{k+1} = f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

rekurzív képlettel definiált sorozatot *fixpont iterációs sorozatnak* hívjuk.

**7.2. Tétel.** *Legyen  $f$  folytonos. Ekkor ha egy  $x_0$  kezdeti értékből indított  $x_{k+1} = f(x_k)$  fixpont iterációs sorozat konvergens, akkor a határértéke fixpontja  $f$ -nek.*

**Bizonyítás:** Tegyük fel, hogy  $x_k \rightarrow p$ . Ekkor  $x_{k+1} \rightarrow p$  és a folytonosság miatt  $f(x_k) \rightarrow f(p)$ , de a határérték egyértelmősége miatt ekkor  $p = f(p)$ .  $\square$


Ezek szerint a fixpont iterációs sorozatot használhatjuk a fixpont közelítésére: ha  $k$  „elegendően nagy”, akkor  $x_k$  „közel lesz”  $p$ -hez (feltéve, hogy a sorozat konvergál). A fixpont iterációs sorozatokat valós függvények esetén ún. *lépcsős diagrammal* lehet szemléltetni, lásd a 7.4. ábrát.

Az alábbi tétel szerint a 7.1. tétel feltételei elegendőek arra, hogy garantálják a fixpont iterációs sorozatok konvergenciáját.


**7.3. Tétel.** *Legyen  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  folytonos és  $(a, b)$ -n differenciálható függvény, és tegyük fel, hogy létezik olyan  $0 \leq c < 1$  konstans, hogy  $|f'(x)| \leq c$  minden  $x \in (a, b)$ -re. Ekkor minden  $x_0 \in [a, b]$ -re az  $x_{k+1} = f(x_k)$  fixpont iterációs sorozat konvergál az  $f$  függvény egyértelmű fixpontjához.*

**Bizonyítás:** A  $p$  fixpont létezése és egyértelmősége következik a 7.1. tételből. A sorozat konvergenciája az alábbi egyenlőtlenségből adódik, amelyet a Lagrange-féle középérték-tételt,  $c$  definícióját és teljes indukciót alkalmazva kapunk:

$$|x_k - p| = |f(x_{k-1}) - f(p)| = |f'(\xi_{k-1})| |x_{k-1} - p| \leq c |x_{k-1} - p| \leq c^k |x_0 - p|. \quad \square$$



7.3. ábra.



7.4. ábra.

## 7.2. Banach-féle kontrakciós elv

Legyen  $(X, d)$  metrikus tér és  $F: X \rightarrow X$  egy leképezés. Azt mondjuk, hogy  $F$ -nek  $p$  *fixpontja*, ha

$$p = F(p).$$

Az  $x = F(x)$  egyenletet *fixpont egyenletnek* nevezzük.

Azt mondjuk, hogy  $F$  *kontrakció* vagy más szóval *kontraktív leképezés*  $X$ -en, ha létezik olyan  $c \in [0, 1)$  valós szám, hogy

$$d(F(x), F(y)) \leq cd(x, y), \quad x, y \in X.$$

Megjegyezzük, hogy a definícióból rögtön következik, hogy minden kontrakció folytonos is.

A 7.3. tétel bizonyításából látható, hogy ha  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos és differenciálható valós függvényre  $|F'(x)| \leq c < 1$ ,  $x \in (a, b)$ , akkor  $F$  kontrakció  $[a, b]$ -n. A kontrakciós tulajdonsághoz viszont nem szükséges, hogy  $F$  differenciálható legyen, pl.  $F(x) = \frac{1}{2}|x|$  kontrakció  $\mathbb{R}$ -en.

A 7.3. tétel általánosítása metrikus terekre az alábbi alapvető eredmény, amelyet *Banach-féle fixpont tételnek* vagy *kontrakciós elvnek* is hívunk. A tételt alkalmazását egy egyenlet megoldásának meghatározására vagy a megoldás közelítésére *szukcesszív approximáció módszerének* is szokták hívni.

**7.4. Tétel (Banach-féle fixpont tétel).** *Legyen  $(X, d)$  egy teljes metrikus tér,  $F: X \rightarrow X$  egy kontrakció. Ekkor  $F$ -nek pontosan egy  $p$  fixpontja létezik  $X$ -en, és tetszőleges  $x_0 \in X$ -re az*

$$x_{k+1} = F(x_k)$$

*fixpont iterációs sorozat konvergál  $p$ -hez.*

**Bizonyítás:** Legyen  $x_0 \in [a, b]$  tetszőleges, és  $x_{k+1} = F(x_k)$ ,  $k = 0, 1, \dots$ . Megmutatjuk, hogy  $(x_k)$  konvergens. Ehhez elegendő belátni, hogy Cauchy-sorozat. Legyen tehát  $k > m$ , és tekintsük  $d(x_k, x_m)$ -t. A háromszög-egyenlőtlenséget, a sorozat definícióját és a kontrakciós tulajdonságot használva kapjuk

$$\begin{aligned} d(x_k, x_m) &\leq d(x_k, x_{k-1}) + d(x_{k-1}, x_{k-2}) + \dots + d(x_{m+1}, x_m) \\ &= d(F(x_{k-1}), F(x_{k-2})) + d(F(x_{k-2}), F(x_{k-3})) + \dots + d(F(x_m), F(x_{m-1})) \\ &\leq cd(x_{k-1}, x_{k-2}) + cd(x_{k-2}, x_{k-3}) + \dots + cd(x_m, x_{m-1}). \end{aligned}$$

Az egyes tagokban ismételten (tagonként különböző sokszor) alkalmazva a sorozat definícióját és a kontrakciós tulajdonságot következik, hogy

$$d(x_k, x_m) \leq (c^{k-1} + c^{k-2} + \dots + c^m)d(x_1, x_0),$$

és ezért

$$d(x_k, x_m) \leq \left( \sum_{j=m}^{\infty} c^j \right) d(x_1, x_0) = \frac{c^m}{1-c} d(x_1, x_0) \rightarrow 0, \quad \text{ha } m, k \rightarrow \infty.$$

Tehát  $(x_k)$  Cauchy-sorozat, és így konvergens. Legyen  $x_k \rightarrow p$ , ha  $k \rightarrow \infty$ . Megmutatjuk, hogy  $p$  fixpontja  $F$ -nek. Mivel  $x_{k+1} = F(x_k)$ , így mindkét oldal határértékét véve, és használva  $F$  folytonosságát, kapjuk, hogy  $p = F(p)$ , azaz  $p$  fixpontja  $F$ -nek.

Tegyük fel, hogy  $F$ -nek  $p$  és  $q$  fixpontja. Ekkor  $F$  kontrakciós tulajdonságát felhasználva

$$d(p, q) = d(F(p), F(q)) \leq cd(p, q),$$

ami csak úgy lehet, hogy  $d(p, q) = 0$ , azaz  $p = q$ . □

Mivel egy normált tér egyben metrikus tér is, sőt, egy normált tér tetszőleges részhalmaza is metrikus tér a norma által generált metrikában, a 7.4. tétel következményeként kapjuk a Banach-féle fixpont tétel normált terekre vonatkozó alakját.

**7.5. Tétel (Banach fixpont tétele normált terekre).** Legyen  $(X, \|\cdot\|)$  Banach-tér,  $E \subset X$  zárt halmaz, és  $F: E \rightarrow E$  egy kontrakció  $E$ -n, azaz létezik olyan  $0 \leq c < 1$  konstans, hogy

$$\|F(x) - F(y)\| \leq c\|x - y\|, \quad x, y \in E.$$

Ekkor  $F$ -nek pontosan egy fixpontja létezik  $E$ -en, amely tetszőleges  $E$ -beli kezdőpontból indított fixpont iteráció határértékeként megkapható.

Legyen  $(X, \|\cdot\|)$  egy normált tér. Egy  $T: X \rightarrow X$  leképezést *affin leképezésnek* hívjuk, ha  $Tx = Ax + b$  alakú, ahol  $A: X \rightarrow X$  egy lineáris leképezés,  $b \in X$ . Affin leképezés esetén a kontrakciós tulajdonság azzal ekvivalens, hogy az  $A$  lineáris leképezés normája 1-nél kisebb. Kapjuk ezért a következő speciális alakját a 7.4. tételnek:

**7.6. Tétel (Banach fixpont tétele lineáris leképezésekre).** Legyen  $(X, \|\cdot\|)$  egy Banach-tér, és  $T: X \rightarrow X$ ,  $Tx = Ax + b$  egy affin leképezés, amelyre  $\|A\| < 1$ . Ekkor  $T$ -nek pontosan egy fixpontja létezik  $X$ -en, amely tetszőleges kezdőpontból indított fixpont iteráció határértékeként megkapható.

## 7.3. Banach-féle fixpont tétel alkalmazásai

### 7.3.1. Newton-módszer

Oldjuk meg az  $f(x) = 0$  egyenletet, ahol  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kétszer folytonosan differenciálható. Legyen  $x_0 \in \mathbb{R}$  adott. Közelítsük  $f(x)$ -et  $x_0$ -körüli lineáris Taylor-polinommal, és tekintsük az

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

egyenletet. Ha  $f'(x_0) \neq 0$ , akkor ennek megoldása

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Az  $x_1$  pontban ismételjük a fenti eljárást, így kapjuk az

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \tag{7.2}$$

iterációs sorozatot. Megmutatjuk, hogy ha  $x_0$  elegendően közel van az  $f$  függvény  $p$  gyökéhez, akkor a (7.2) sorozat konvergál  $p$ -hez. A (7.2) képlettel definiált numerikus módszert  $f$  gyökének keresésére *Newton-módszernek* hívjuk.

**7.7. Tétel.** Ha  $f$  kétszer folytonosan differenciálható,  $f(p) = 0$ ,  $f'(p) \neq 0$ , akkor létezik olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x_0 \in [p - \delta, p + \delta]$  esetén a (7.2) Newton-sorozat konvergál  $p$ -hez.

**Bizonyítás:** Tekintjük az

$$F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

függvényt. Nyilván  $F(p) = p$  akkor és csak akkor, ha  $f(p) = 0$ . Mivel

$$F'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2},$$

ezért  $F'(p) = 0$ . A feltétel szerint  $F'$  folytonos, ezért egy tetszőlegesen rögzített  $0 < c < 1$ -hez létezik olyan  $\delta > 0$ , hogy  $|F'(x)| < c$  ha  $x \in [p - \delta, p + \delta]$ .

Az  $F$  függvény a  $[p - \delta, p + \delta]$  intervallumon kontrakció a  $c$  konstanssal, ugyanis a Lagrange-féle középérték-tételt alkalmazva

$$|F(x) - F(y)| = |F'(\xi)||x - y| \leq c|x - y|$$

teljesül minden  $x, y \in [p - \delta, p + \delta]$ -ra. A kontrakciós tulajdonságból következik, hogy  $F$  a  $[p - \delta, p + \delta]$  intervallumot önmagába képezi le, ugyanis egy tetszőleges  $x \in [p - \delta, p + \delta]$ -re

$$|F(x) - p| = |F(x) - F(p)| \leq c|x - p| < |x - p| < \delta.$$

Ebből következik, hogy az  $F: [p - \delta, p + \delta] \rightarrow [p - \delta, p + \delta]$  függvényre alkalmazható a 7.5. tétel, amiből következik az állítás.  $\square$

### 7.3.2. Jacobi-iteráció

Tekintsük az

$$Ax = b$$

lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{és} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Keressük meg az egyenletrendszer megoldását a szukcesszív approximáció módszerével! Ehhez alakítsuk át az egyenletet fixpont egyenlet alakra. Tekintsük az  $i$ -edik egyenletet:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Tegyük fel, hogy  $a_{ii} \neq 0$  ( $i = 1, \dots, n$ ). Az  $i$ -edik egyenletből fejezzük ki az  $i$ -edik változót:

$$x_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Ezt vektoriális alakba felírva kapjuk, hogy

$$x = -\tilde{A}x + \tilde{b},$$

ahol

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & \frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{a_{n1}}{a_{nn}} & \frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \tilde{b} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

A 7.5. tételt alkalmazva kapjuk rögtön az alábbi eredményt. Ehhez szükségünk van a következő fogalomra. Egy  $A$   $n \times n$ -es négyzetes mátrixot *diagonálisan dominánsnak* nevezzük, ha

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n.$$

**7.8. Tétel.** Ha az  $Ax = b$  egyenletrendszer  $A$  együtthatómátrixa diagonálisan domináns, akkor az  $Ax = b$  egyenletnek pontosan egy megoldása van, amelyet megkapunk tetszőleges  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$  kezdeti értékből kiindulva az

$$x^{(k+1)} = -\tilde{A}x^{(k)} + \tilde{b}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (7.3)$$

iterációs vektorsorozat határértékeként.

**Bizonyítás:** A 7.5. tétel szerint elegendő megmutatnunk, hogy az

$$F(x) = -\tilde{A}x + \tilde{b}$$

leképezés kontrakció a  $\|\cdot\|_\infty$  vektornormában. Mivel a normák tulajdonságait használva

$$\|F(x) - F(y)\|_\infty = \|\tilde{A}(x - y)\|_\infty \leq \|\tilde{A}\|_\infty \|x - y\|_\infty,$$

ezért elegendő azt megmutatnunk, hogy az  $\|\tilde{A}\|_\infty$  mátrixnorma 1-nél kisebb. Az 5.72. tétel alapján és a diagonális dominancia definíciója szerint

$$\|\tilde{A}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1.$$

□

A (7.3) iterációs vektorsorozatot koordinátánként kiírva kapjuk az

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

rekurzív definíciót az  $(x_1^{(k)}), \dots, (x_n^{(k)})$  sorozatok számolására. Ezt az iterációs módszert lineáris egyenletrendszerek megoldásai közelítésére *Jacobi-iterációnak* nevezzük.

### 7.3.3. Nemlineáris differenciálegyenletek megoldása

Tekintsük az

$$x' = f(t, x), \quad t \in (a, b) \quad (7.4)$$

$$x(t_0) = u \quad (7.5)$$

kezdeti érték feladatot, ahol  $f: (a, b) \times T \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $T \subset \mathbb{R}^n$  nyílt halmaz,  $t_0 \in (a, b)$ ,  $u \in T$ . (Megengedjük, hogy  $a = -\infty$  vagy  $b = \infty$  legyen.)

Azt mondjuk, hogy az  $f: (a, b) \times T \rightarrow \mathbb{R}^n$  függvény *lokálisan Lipschitz-tulajdonságú a második változójában* a  $\|\cdot\|$  vektornormában, ha minden  $[c_0, d_0] \subset (a, b)$  intervallumhoz és

$$G := [c_1, d_1] \times \dots \times [c_n, d_n] \subset T$$

zárt  $n$ -dimenziós intervallumhoz létezik olyan  $L \geq 0$  konstans, amelyre

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad t \in [c_0, d_0], \quad x, y \in G.$$

**7.9. Tétel.** Legyen  $T \subset \mathbb{R}^n$  nyílt halmaz,  $f: (a, b) \times T \rightarrow \mathbb{R}^n$  folytonos függvény, amely lokálisan Lipschitz-tulajdonságú a második változójában a  $\|\cdot\|$  vektornormában. Ekkor bármely  $t_0 \in (a, b)$ -hez és  $u \in T$ -hez létezik olyan  $h > 0$  konstans, hogy a (7.4)-(7.5) kezdeti érték feladatnak létezik egyértelmű megoldása a  $[t_0 - h, t_0 + h]$  intervallumon.

**Bizonyítás:** Integrálva a (7.4) egyenletet  $t_0$ -tól  $t$ -ig, és használva a (7.5) kezdeti feltételt, kapjuk

$$x(t) = u + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad t \geq t_0. \quad (7.6)$$

Legyen  $u = (u_1, \dots, u_n)$ . Mivel  $t_0 \in (a, b)$ ,  $u \in T$  és  $T$  nyílt részhalmaza  $\mathbb{R}^n$ -nek, ezért létezik olyan  $r > 0$  konstans, hogy  $[t_0 - r, t_0 + r] \subset (a, b)$  és a

$$G := [u_1 - r, u_1 + r] \times \dots \times [u_n - r, u_n + r]$$

halmaz korlátos zárt részhalmaza  $T$ -nek.  $f$  lokális Lipschitz-tulajdonsága miatt létezik  $L$ , hogy

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad t \in [t_0 - r, t_0 + r], \quad x, y \in G.$$

Legyen  $h$  olyan, hogy

$$0 < h \leq r \quad \text{és} \quad hL < 1.$$

Tekintsük a  $(C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$  Banach-teret, ahol a normát a

$$\|g\|_\infty = \max_{t \in [t_0 - h, t_0 + h]} \|g(t)\|, \quad g \in C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n)$$

képlettel értelmezzük, és definiáljuk az

$$F: (C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$$

leképezést az

$$(F(x))(t) = u + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad t \in [t_0 - h, t_0 + h]$$

képlettel. Megmutatjuk, hogy  $F$  kontraktív leképezés a  $c := Lh < 1$  konstanssal. Ehhez használjuk fel  $f$  Lipschitz-tulajdonságát és elemi becsléseket:

$$\begin{aligned} \|F(x) - F(y)\|_\infty &= \max_{t \in [t_0 - h, t_0 + h]} \|(F(x))(t) - (F(y))(t)\| \\ &= \max_{t \in [t_0 - h, t_0 + h]} \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) ds \right\| \\ &\leq \max_{t \in [t_0 - h, t_0 + h]} \left| \int_{t_0}^t \|f(s, x(s)) - f(s, y(s))\| ds \right| \\ &\leq L \max_{t \in [t_0 - h, t_0 + h]} \left| \int_{t_0}^t \|x(s) - y(s)\| ds \right| \\ &\leq L \|x - y\|_\infty \max_{t \in [t_0 - h, t_0 + h]} |t - t_0| \\ &= Lh \|x - y\|_\infty. \end{aligned}$$

A 7.5. tételből következik, hogy  $F$ -nek létezik egyértelmű fixpontja a  $C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n)$  térben, legyen ez  $\bar{x}$ . Megmutatjuk, hogy  $\bar{x}$  megoldása a (7.4)-(7.5) kezdeti érték feladatnak. Mivel  $\bar{x}$  teljesíti a (7.6) integrálegyenletet, ezért  $\bar{x}(t_0) = u$ , és  $\bar{x}$  differenciálható, hiszen  $f(s, \bar{x}(s))$  folytonos  $s$ -ben. Ezért differenciálva a (7.6) egyenlet mindkét oldalát, kapjuk, hogy  $\bar{x}$  teljesíti a (7.4) egyenletet  $t \in [t_0 - h, t_0 + h]$ -ra.  $\square$

Egy egyszerűen ellenőrizhető feltétel ad a lokális Lipschitz-tulajdonság teljesülésére az alábbi állítás.

**7.10. Állítás.** Ha az  $f: (a, b) \times T \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,

$$f(t, x_1, \dots, x_n) = (f_1(t, x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(t, x_1, \dots, x_n))$$

függvény minden  $f_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) komponensfüggvénye folytonosan parciálisan differenciálható minden  $x_1, \dots, x_n$  változója szerint, akkor  $f$  lokálisan Lipschitz-tulajdonságú az  $x = (x_1, \dots, x_n)$  változójában tetszőleges  $\|\cdot\|$  vektornormában.

**Bizonyítás:** Az 5.45. tétel szerint az állítást elegendő a  $\|\cdot\|_1$  normában igazolni, a normák ekvivalenciájából könnyen következik az állítás egy tetszőleges másik normában is.

Legyen  $[c_0, d_0] \subset (a, b)$  és  $G := [c_1, d_1] \times \dots \times [c_n, d_n] \subset T$  zárt intervallum rögzített. Legyen

$$M = \max_{i=1, \dots, n} \max_{j=1, \dots, n} \max \left\{ \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t, x_1, \dots, x_n) \right| : t \in [c_0, d_0], (x_1, \dots, x_n) \in G \right\}.$$

Legyen  $t \in [c_0, d_0]$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in G$ . Ekkor a valós függvényekre ismert Lagrange-féle középérték-tételt alkalmazva következik a bizonyítandó egyenlőtlenség:

$$\begin{aligned} \|f(t, x) - f(t, y)\|_1 &= \sum_{i=1}^n |f_i(t, x_1, \dots, x_n) - f_i(t, y_1, \dots, y_n)| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left( |f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) - f_i(t, y_1, x_2, \dots, x_n)| \right. \\ &\quad \left. + |f_i(t, y_1, x_2, x_3, \dots, x_n) - f_i(t, y_1, y_2, x_3, \dots, y_n)| + \dots \right. \\ &\quad \left. + |f_i(t, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, x_n) - f_i(t, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_n)| \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left( M|x_1 - y_1| + \dots + M|x_n - y_n| \right) \\ &= nM\|x - y\|_1. \end{aligned}$$

□

## 7.4. Néhány további fixpont tétel

### 7.4.1. Brouwer-féle fixpont tétel

Bizonyítás nélkül tekintsük az alábbi eredményt.

**7.11. Tétel (Brouwer-féle fixpont tétel).** Legyen  $G \subset \mathbb{R}^n$  korlátos, zárt és konvex halmaz,  $f: G \rightarrow G$  folytonos. Ekkor  $f$ -nek létezik legalább egy fixpontja  $G$ -ben.

A tétel alkalmazásaként megemlíjtjük az alábbi eredményt.

**7.12. Tétel (Perron tétele).** Legyen az  $A$   $n \times n$ -es mátrix minden  $a_{ij}$  komponense pozitív. Ekkor  $A$ -nak van legalább egy pozitív sajátértéke, amelyhez megadható egy csupa nemnegatív komponensekből álló sajátvektor.

**Bizonyítás:** Legyen

$$G := \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i = 1, \dots, n \text{ és } \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}.$$



Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy  $G$  korlátos, zárt és konvex részhalmaza  $\mathbb{R}^n$ -nek. Legyen továbbá

$$f: G \rightarrow G, \quad f(x) = \frac{Ax}{\|Ax\|_1}.$$

Ekkor nyilván  $f$  folytonos, hiszen minden vektornorma folytonos függvény és  $x \mapsto Ax$  is folytonos leképezés. Ezért a Brouwer-féle fixpont tétel szerint létezik legalább egy fixpontja  $f$ -nek  $G$ -ben, legyen ez  $v \in G$ . Ekkor  $v$ -re

$$\frac{Av}{\|Av\|_1} = v,$$

azaz  $Av = \|Av\|_1 v$  teljesül. De ekkor  $\lambda = \|Av\|_1$  sajátértéke  $A$ -nak a  $v$  sajátvektorral.  $\square$

#### 7.4.2. Schauder-féle fixpont tétel

Azt mondjuk, hogy egy  $X$  normált tér  $U$  részhalmaza *prekompakt*, ha lezártja kompakt  $X$ -ben. A 3.42. tétel szerint az  $\mathbb{R}^n$  tér minden korlátos részhalmaza prekompakt.

Az  $[a, b]$  intervallumon értelmezett függvényeknek egy  $V$  halmazát *egyenletesen korlátosnak* nevezzük, ha létezik olyan  $K$  konstans, hogy  $|f(x)| \leq K$  minden  $f \in V$ -re. A  $V$  függvénycsaládot *egyenlő mértékben egyenletesen folytonosnak* hívjuk, ha tetszőleges  $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan  $\delta > 0$ , hogy minden olyan  $x, \tilde{x} \in [a, b]$ -re, amelyre  $|x - \tilde{x}| < \delta$ , és minden  $f \in V$ -re  $|f(x) - f(\tilde{x})| < \varepsilon$  teljesül.

A következő tétel szükséges és elégséges feltételt ad a folytonos függvények terében arra, hogy egy részhalmaz prekompakt-e.

**7.13. Tétel (Arzelà-Ascoli).** *Az  $[a, b]$  intervallumon értelmezett folytonos függvényeknek egy  $V$  halmazrendszere akkor és csak akkor prekompakt a  $(C([a, b], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$  Banach-térben, ha  $V$  egyenletesen korlátos és egyenlő mértékben egyenletesen folytonos függvényhalmaz.*

Tekintsük a következő fixpont tételt.

**7.14. Tétel (Schauder-féle fixpont tétel).** *Legyen  $E$  zárt, konvex és nem-üres részhalmaza az  $X$  Banach-térnek. Legyen*

$$F: E \rightarrow E$$

*folytonos operátor úgy, hogy  $F(E)$  prekompakt  $X$ -ben. Ekkor az  $F$  operátornak van legalább egy fixpontja  $E$ -ben.*

A fenti két tétel segítségével megmutathatjuk a differenciálegyenletek megoldásai létezését garantáló alábbi egzisztencia tételt.

Tekintsük az

$$x' = f(t, x) \tag{7.7}$$

$$x(t_0) = u \tag{7.8}$$

kezdeti érték feladatot, ahol  $f: [t_0 - a, t_0 + a] \times [u - b, u + b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u \in \mathbb{R}$ ,  $a, b > 0$ . A Schauder-féle fixpont tételt alkalmazva kapjuk:

**7.15. Tétel (Peano tétele).** *Legyen  $f: [t_0 - a, t_0 + a] \times [u - b, u + b] \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény amely maximumát  $M$  jelöli, azaz  $M = \max\{|f(t, x)| : |t - t_0| \leq a, |x - u| \leq b\}$ . Legyen  $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ . Ekkor a (7.7)-(7.8) kezdeti érték feladatnak létezik legalább egy megoldása az  $I = [t_0 - h, t_0 + h]$  intervallumon.*

**Bizonyítás:** Tekintsük az  $I$ -n definiált folytonos függvények  $C(I, \mathbb{R})$  Banach-terét a  $\|g\|_\infty = \max_{t \in I} |g(t)|$  normával. Legyen

$$E = \{g \in C(I, \mathbb{R}) : |g(t) - u| \leq b, t \in I\}.$$

Definiáljuk az  $F$  nemlineáris operátort az

$$(F(x))(t) = u + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad t \in I, \quad x \in E$$

képlettel. Mivel  $x \in E$ , ezért  $f(s, x(s))$ , és így  $F(x)$  is jól definiált. Továbbá

$$|(F(x))(t) - u| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \right| \leq M|t - t_0| \leq Mh \leq b, \quad t \in I,$$

azaz  $F(x) \in E$ . Nyilván  $E$  nem üres, konvex részhalmaza  $C(I, \mathbb{R})$ -nek. Megmutatjuk, hogy  $F(E)$  prekompakt  $C(I, \mathbb{R})$ -ben. Az Arzelà-Ascoli tétel szerint ehhez elegendő megmutatnunk, hogy  $F(E)$  egyenletesen korlátos és egyenlő mértékben egyenletesen folytonos. Mivel

$$\|F(x)\|_\infty = \max_{t \in I} \left| u + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \right| \leq |u| + Mh, \quad x \in E,$$

ezért  $F(E)$  egyenletesen korlátos. Másrészt minden  $t, \tilde{t} \in I$ -re

$$|(F(x))(t) - (F(x))(\tilde{t})| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds - \int_{t_0}^{\tilde{t}} f(s, x(s)) ds \right| = \left| \int_{\tilde{t}}^t f(s, x(s)) ds \right| \leq M|t - \tilde{t}|,$$

amiből következik az  $F(E)$  függvényrendszer egyenlő mértékű egyenletes folytonossága. Teljesül tehát a Schauder-tétel minden feltétele, ezért az  $F$  függvénynek létezik legalább egy  $\bar{x}$  fixpontja. Könnyen látható, hogy  $\bar{x}$  teljesíti a (7.7) differenciálegyenletet  $I$ -n és a (7.8) kezdeti feltételt is.  $\square$

### 7.4.3. Knaster-Tarski fixpont tétel

Egy  $X$  valós Banach-tér  $K$  nemüres részhalmazát *kúp*nak nevezzük, ha:

1.  $\alpha \in [0, \infty)$  és  $x \in K$  esetén  $\alpha x \in K$
2.  $x, y \in K$  esetén  $x + y \in K$
3.  $x \in K \setminus \{0\}$  esetén  $-x \notin K$ .

Legyen  $K$  egy nemüres belsejű  $K$  kúp az  $X$  Banach-térben. Ekkor definiálunk egy „ $\leq$ ”-vel jelölt relációt  $X$ -en:  $x \leq y$ , ha  $y - x \in K$ . Megmutatható, hogy  $\leq$  egy parciális rendezés  $X$ -en, azaz  $(X, \leq)$  egy parciálisan rendezett halmaz lesz.

Legyen  $M$  egy tetszőleges részhalmaza az  $(X, \leq)$  parciálisan rendezett Banach-térnek. Azt mondjuk, hogy egy  $y \in X$  elem *felső korlátja*  $M$ -nek, ha

$$x \leq y, \quad \text{minden } x \in M\text{-re.}$$

Azt mondjuk, hogy a  $\sup M \in X$  elem az  $M$  halmaz *szuprémuma*, ha

1.  $\sup M$  felső korlátja  $M$ -nek, és

2. ha  $y \in X$  felső korlátja  $M$ -nek, akkor  $\sup M \leq y$ ,

azaz  $\sup M$  a legkisebb felső korlátja  $M$ -nek. Hasonlóan definiálható  $\inf M$  is.

**7.16. Tétel.** (Knaster-Tarski fixpont tétele). Legyen  $(X, \leq)$  egy parciálisan rendezett Banach-tér,  $M$  az  $X$  olyan részhalmaza, amelyre teljesülnek a következők:

1.  $\inf M \in M$ ,

2. Minden  $N \subset M$  nemüres részhalmazra  $\sup N \in M$ .

Legyen  $F: M \rightarrow M$  egy monoton növekvő leképezés, azaz

$$F(x) \leq F(y), \quad \text{ha } x, y \in M \quad \text{és} \quad x \leq y.$$

Ekkor  $F$ -nek van fixpontja az  $M$ -ben, továbbá az  $F$  leképezés fixpontjai között létezik legkisebb. Ha  $F$  fixpontja egyértelmű és  $x_0 \in M$  olyan, hogy vagy  $x_0 \leq F(x_0)$  vagy  $x_0 \geq F(x_0)$ , akkor az  $x_{k+1} = F(x_k)$  fixpont iterációs sorozat konvergál az  $F$  leképezés fixpontjához.